

Aus der Universitäts-Kinderklinik Erlangen,
Lehrer Medizinalrat Professor Dr. med. Friedrich Jamin.

Die Schwellungen der Halslymphknoten der Kinder bei Tuberkulose und Scharlach und ihre inneren und äußeren Ursachen.

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde
der Zahnheilkunde
der hohen medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität
Erlangen

vorgelegt von
Georg Herbst
Zahnarzt aus Bamberg.

Tag der mündlichen Prüfung: 22. Dezember 1936.

1936

Buchdruckerei Karl Döres, Erlangen, Jägerstraße 3.

Dekan und Referent:
Geheimer Medizinalrat Professor Dr. med. Friedrich Jamin

Meinen lieben Eltern in Dankbarkeit
gewidmet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Lymphgefäße haben die Aufgabe, die in den Geweben menschlichen Körpers vorhandenen lymphatischen Flüssigkeiten aufzusaugen und von neuem den Blutgefäßen zuzuführen, denen sie vorher in die Gewebe transudiert waren. An vielen Stellen dieser Lymphbahnen sind nun knotenförmige Gebilde eingeschaltet, die wir schlechtweg Lymphdrüsen nennen, obwohl ihnen eine eigentliche Drüsenfunktion im engeren Sinne des Wortes nicht zukommt. Die Form dieser Lymphknoten ist rundlich bis länglich. Was ihren mikroskopischen Bau angeht, so bestehen sie aus reticulärem Bindegewebe, in dessen Maschen zahlreiche Rundzellen die sogen. Lymphkörperchen eingelagert sind, welche sich in ihrem Aufbau von farblosen Blutkörperchen (Lymphozyten) nicht wesentlich unterscheiden. Man hat infolgedessen beide Arten von Zellen identifiziert und die Lymphdrüsen als eine Hauptbildungsstätte der Lymphozyten angesehen. In der Regel sind diese Lymphknoten in der Nähe von Venenstämmen, auch am Verzweigungswinkel zweier Venenäste zu suchen. Wenn hier nun die Rede von Lymphdrüsen des Halses sein soll, so seien die hauptsächlichsten des Kopfes und des Halses (die Drüsen der Kopflymphdrüsen lassen sich klinisch von denen des Halses oft gar nicht, oder nur äußerst schwer trennen) wie sie uns Broesike aufzählt, wiedergegeben.

a) Oberflächliche Drüsen:

Glandulae occipitales (1—2) sind auf der Ursprungssehne des M. trapezius unweit der Protub. occip. externa gelegen.

Glandulae auriculares posteriores (subauriculares) 2—3 liegen hinter dem Ohr auf der Insertion des M. sternocleidomastoideus.

Glandulae submaxillares (8—10) liegen zum Teil an der inneren Fläche, zum Teil auf dem Rande des Unterkiefers.

Glandulae auriculares anteriores (2—4) liegen zum Teil vor dem Ohr zum Teil in der Substanz der Parotis.

5. Glandulae linguales (2—4) liegen zur Seite des M. geniohyoglossus.
6. Glandulae cervicales superficiales (4—5) liegen längs der Vv. jugularis externa auf dem M. sternocleidomastoideus.

b) Tiefe Drüsen:

7. Glandulae faciales profundae liegen in der Fossa sphenomaxillaris, auf dem hinteren Teil des M. buccinator und an der Seitenwand des Pharynx.
8. Glandulae cervicales profundae 10—16 sind längs Vv. jugularis int. und der Carotiden gelegen.
9. Glandulae supraclaviculares liegen in der Fossa supraclaviculari major neben dem Plexus brachialis.

Gerade die Zahl der nachweisbaren, zuletzt aufgezählten Halslymphdrüsen ist besonders beim Kind groß, während beim Erwachsenen bedeutenden Schwankungen unterworfen sein kann.

Ohne Zweifel haben die Lymphdrüsen die Aufgabe, den Körper vor der Infektion soweit wie möglich zu schützen oder doch wenigstens die Verallgemeinerung eines derartigen Prozesses aufzuhalten. Corent bezeichnet sie gleichsam als vorgeschobene Forts einer Festung, die an der Peripherie des Körpers verteilt sind. Hier findet dann oft der Hauptkampf statt, dessen Ausgang über das Schicksal des Individuums entscheidet. Nach seiner Vorstellung können aus den durch ihre Kapsel peripher abgeschlossen Drüsen die Bakteriengifte nicht so leicht diffundieren, zurückgehalten häufen sie sich zu hohen Konzentrationen an und rufen intensivste Gewebsreaktion hervor. Auf diese Weise verhindern sie die weitere Verbreitung der Bazillen, freilich auf Kosten ihrer eigenen Existenz, und schützen das Individuum vor der Gesamtinfektion.

Nach Wullstein und Willms teilt man nun die Erkrankungen der Lymphdrüsen allgemein ein:

1. in entzündliche Erkrankungen (einfache chronische tuberkulöse, syphilitische);
2. in Systemerkrankungen (leukämische und pseudoleukämische);
3. in Neubildungen (Sarkome und Carzinome).

Von diesen aufgezählten Erkrankungen nehmen die tuberkulösen Entzündungen der Lymphdrüsen die erste Stelle ein. Wenn nun die Lymphdrüsen überhaupt Schlupfwinkel, ja Bastionen des Tuberkel-Bazillus bilden, da er in ihnen am leichtesten

ur Entwicklung gelangt — gerade beim Kinde finden wir am
 lterhäufigsten seine Wirkungen in ihnen — so ist doch das Rea-
 eren der verschiedenen Körpergegenden auf das tuberkulöse
 irus nicht gleichmäßig. Allgemein ist die Feststellung gemacht,
 aß die Halsdrüsen am häufigsten bei tuberkulöser Infektion in
 itleidenschaft gezogen werden (nach Hildebrandt 80%). Im weiten
 bstand folgen dann erst die tuberkulösen Erkrankungen der
 eistendrüsen, der Achselhöhlendrüsen und die der Drüsen an
 er seitlichen Brustwand. Diese tuberkulösen Halslymphdrüsen
 eten im allgemeinen als Geschwülste und zwar oft als recht
 sehnliche in Erscheinung; daher bezeichnen wir sie auch als
 berkulöse „Lymphome“, die eine feuchte, saftige Beschaffenheit
 rer Schnittfläche zeigen und ein etwas speckiges Aussehen haben.

Daß nun die Tuberkulose der Lymphknoten vor allem eine
 rkrankung des Kindes und des jugendlichen Alters darstellt, will
 h in Form einer Statistik zeigen, die Fr. Fischer aus den Be-
 chten verschiedener Autoren zu einer großen Sammelstatistik
 ereinigt hat und danach entfallen von 1484 Fällen

59	= 3,97%	auf das 1.—5. Lebensjahr	
120	= 8,08%	„ „ 6.—10.	„
233	= 15,70%	„ „ 11.—15.	„
469	= 31,60%	„ „ 16.—20.	„
282	= 19,00%	„ „ 21.—25.	„
130	= 8,76%	„ „ 26.—30.	„
63	= 4,25%	„ „ 31.—35.	„
43	= 2,89%	„ „ 36.—40.	„
25	= 1,68%	„ „ 41.—45.	„
29	= 1,95%	„ „ 46.—55.	„
18	= 1,21%	„ „ 56.—66.	„

Most führt weiter dann noch 89 Beobachtungen an, von
 enen treffen:

8 Fälle auf das	1.— 5. Lebensjahr	Die jüngste Patien- tin war 2½ Jahre alt
16	„ „ „ 6.—10.	„
15	„ „ „ 11.—15.	„
25	„ „ „ 16.—20.	„
13	„ „ „ 21.—25.	„
6	„ „ „ 26.—30.	„
2	„ „ „ 31.—35.	„
3	„ „ „ 36.—45.	„

Zu den Männern, die am frühesten Untersuchungen über
 e Häufigkeit von Lymphdrüsenanschwellungen im Kindesalter vor-

genommen haben, gehört Volland. Ihm gebührt auch gleichzeitig das Verdienst, frühzeitig die Frage nach dem Zusammenhang zwischen den tuberkulösen Lymphknoten im Kindesalter und einer später entstandenen Lungentuberkulose zur Erörterung aufgeworfen zu haben. Volland untersuchte 2306 Individuen im Alter von 7—24 Jahren. Dabei zeigte sich, daß unter 7—12jährigen Kindern 91—93% geschwollene Halsdrüsen hatten. Volland verwahrt sich zwar dagegen, daß diese geschwollenen Lymphdrüsen alle tuberkulös infiziert waren; doch nimmt er an, daß in den meisten Fällen eine derartige Infektion vorliege und baut hierauf seine Theorie der Infektion mit Tuberkelbazillen von der Haut und den Schleimhäuten aus durch Schmutz und Unreinlichkeit. Harbitz konnte unter 91 Kindern, die weder makroskopisch noch mikroskopisch und auch nicht klinisch Zeichen von Tuberkulose aufwiesen, in 18 Fällen durch den Tierversuch virulente Tuberkelbazillen in den Lymphdrüsen finden.

Im allgemeinen ist die Frequenzziffer der tuberkulösen Drüsenerkrankungen in den allerersten Lebensjahren noch eine sehr niedrige um im 2. Decenium auf ihren Höhepunkt zu steigen und dann allmählich wieder abzufallen. Obwohl also in den ersten Lebensjahren der Lymphgefäßapparat die schnellste anatomische Entfaltung zeigt und deshalb nach Ansicht der Forscher für die Infektion äußerst empfänglich ist, bleibt die Häufigkeitsskala doch zurück. Wahrscheinlich nimmt die Infektionsgelegenheit erst in den späteren Jahren zu und schließlich ist auch zu bedenken, daß es sich hier um eine chronische Erkrankung handelt, sodaß der Zeitpunkt der Infektion oft lange Zeit zurückliegen kann. Der Unterschied und die Eigentümlichkeit, die die Tuberkulose der späteren Lebensjahre von der der Kinder kennzeichnen, besteht also in dem starken Anschwellen der Lymphdrüsen, besonders der Halslymphdrüsen. Während man beim Erwachsenen die Lungentuberkulose weitaus am häufigsten vor allem anderen Tuberkulose-Formen feststellen kann. Dabei ist aber bei diesen Lymphomen eine tuberkulöse Entzündung der Lymphgefäßstämme direkt eine relativ äußerst seltene Erkrankungsform. Ja selbst im Wurzelgebiet derselben sind sehr oft keine nachweisbaren Prozesse zu finden. Gerade dem Kindesalter sind die starken Lymphdrüsenaffektionen bei auffallender Intaktheit der zuführenden Lymphgefäße und des Wurzelgebietes derselben eigentümlich.

Bei diesen tuberkulösen Lymphomen am Halse beobachtet man nun bei den Kindern oft chronische ekzematöse Affektionen im Gesicht, besonders an den Schleimhautübergängen des Mundes

er Nase und am Auge. Solche Kinder haben dann ein gedun-
enes, pastöses Aussehen und bieten mit ihren Halsdrüenschwel-
lungen den Typus der Skrofulose.

Da sich also ergab, daß bei der Skrofulose in der Regel
eine Tuberkulose der Lymphknoten meist des Halses vorliegt
(Bergmann nennt Halsdrüsentuberkulose den „wahren Reprä-
sentanten der Skrofulose“) wurde vielfach vorgeschlagen, die alte
Bezeichnung der Skrofulose ganz aufzugeben und von Tuber-
kulose zu sprechen, wenn die tuberkulöse Infektion festzustellen
ist. Die Mehrzahl jedoch tritt für die Beibehaltung dieses Namens
für ein klinisch ziemlich charakteristisches Krankheitsbild ein.
Obwohl das Krankheitsbild der Skrofulose durch die Vielfältigkeit
der krankhaften Erscheinungen ausgezeichnet ist, so ist für die
Diagnose allein die *Facies scrofulosa* charakteristisch, die sich
besonders bei den Kleinkindern recht deutlich zeigt. Eine kurze
und prägnante Schilderung dieser Erkrankung gibt Escherich:
Das skrofulose Kind mit dem tränenden Auge, der rinnenden
Nase, der verdickten Oberlippe und den nässenden Ekzemen mit
den die Haut vorwölbenden Lymphknoten, dem tumor albus und
den eiternden Knochenfisteln ist eines der häufigsten dem Arzt
wie dem Laien gleich geläufigen Krankheitsbildes. Und dennoch,
so klar und typisch das vollendete Bild der Skrofulose sich dar-
stellt, so schwierig ist eine Definition und Abgrenzung, so wider-
spruchsvoll und wechselnd die Vorstellung, die man im Laufe
der Geschichte und auch heute noch damit verbindet.“

Cornet trennt die Skrofulose aetiologisch in eine pyogene
und eine tuberkulöse Form; erstere wird hervorgerufen durch die
bekannten Eitererreger und bleibt meist auf Haut und Schleim-
haut lokalisiert; letztere wird durch den Tuberkelbazillus veran-
laßt und befällt meist die Drüsen; zwischen beiden Formen kom-
men häufig Mischformen vor. Diese Einteilung wurde von meh-
reren Autoren anerkannt, so besonders von Ponfick. Escherich
bezeichnet die Skrofulose als die nur auf dem Boden der lymph-
atischen Konstitution entstandene und durch die Neigung zu Ober-
flächenkatarrhen charakterisierte Form der infantilen Tuberkulose.

Zwar ist das Wesen der Skrofulose im bakteriologischen
Sinne längst entschieden; aber hier muß doch eine der wesent-
lichen Vorbedingungen im Menschen selbst und zwar in einem
nur der Jugend eigentümlichen Zustand des Körpers liegen, der
sich in den späteren Lebensjahren wieder verliert. Ein weiterer
wichtiger Punkt ist auch noch in der Eigenart der kindlichen
Lebensumstände als Entstehungsbedingung anzusehen. Das fast
ausschließlich in der Jugend beobachtete Auftreten der Skrofulose

mit einer auf Haut, Schleimhäute und das Lymphsystem lokalisierten Krankheitsbereitschaft beruht auf anatomischen Verhältnissen. Es tritt eine weitere Steigerung der der Kindheit schon normalerweise zukommenden erhöhten Durchlässigkeit der Haut, Schleimhaut und Lymphwege ein. Es ist ein Zustand, den Cornet als „gesteigerten Infantilismus oder Embryonalismus“ bezeichnet. Selbstverständlich müssen Durchlässigkeit der Haut, Schleimhaut, sowie weiter der Lymphwege nicht in ihrem abnormen Verhalten parallel gehen, sondern bald kann dies und bald kann jenes überwiegen und dem ganzen Krankheitsbild seinen besonderen Stempelaufdrücken, wenn ein Individuum durch Tuberkel- oder andere Bakterien infiziert ist. Darin dürften wir wohl eine der hauptsächlichen Ursachen der „skrofulösen Veranlagung“ erblicken.

Daß natürlich diese Veranlagung des Körpers zur Skrofulose in den verschiedenen Zeiten die mannigfachste Deutung erhielt, ist leicht verständlich. Einen entschiedenen Fortschritt verdanken wir Virchow, nach dem die noch unfertige, noch wachsende Drüse im kindlichen Alter noch sehr viele Angriffspunkte bietet. Virchow bezeichnete diesen Zustand als entzündliche Diathese. In der Folgezeit kamen dann die Begriffe lymphatische Diathese, Lymphatismus, um die skrofulöse Anlage zu bezeichnen und zugleich ihrem vermeintlichen Wesen als einer erhöhten Neigung zur Schwellung und Veränderung des lymphatischen Gewebes Ausdruck zu geben. In der letzten Zeit hat nun die Diathesenlehre wieder einen neuen Aufschwung genommen. Was früher als entzündliche Diathese bezeichnet wurde, hat neuerdings durch Czerny den Namen exsudative Diathese erhalten. „Sicher,“ so sagt Jamin, „ist die exsudative Diathese eine Art reizbarer Schwäche des ganzen Zellmaterials. Im Einzelfalle treten aber manche Gewebe und Gewebssysteme bei den krankhaften Kündigungen dieser Reizbarkeit mehr in den Vordergrund. Daher konnte man verschiedene Einzeldiathesen aufstellen und sie als exsudativlymphatische, vasomotorische, arthritische, bindegewebige und neuropathische zu bezeichnen.“

Selbst als bereits festgestellt war, daß die alte Vermutung von der tuberkulösen Natur der als Skrofulöse bezeichneten Halsdrüsenaffektionen zu Recht besteht, blieb in den meisten Fällen doch noch unaufgeklärt, wie und von wo aus die Tuberkelbazillen in die Lymphknoten gelangt waren. Abgesehen von den Fällen, wo deutlich tuberkulöse Veränderungen vorhanden waren, so blieb die bei den Kindern so oft als das erste Zeichen der Tuberkulose auftretende Halsdrüsentuberkulose in ihrer Entstehung

ange Zeit völlig ohne Erklärung. Auch dann, wenn man zu der Annahme die Zuflucht nahm, daß eine latente Lungentuberkulose daneben vorhanden sei, so blieb trotzdem die von da aus stattfindende isolierte Infektion der Halsdrüsen immer noch unverständlich, da die anatomischen Wege von den Lymphknoten am Lungenhilus nicht direkt nach dem Halse führen. Anders verhielt es sich natürlich, wenn bei einer hochgradigen Lungentuberkulose sämtliche Lymphknoten des Brustraums bis direkt an die Halsgegend hin infiziert waren, dann war ohne weiteres klar, daß es sich hier um eine aufsteigende Tuberkulose handelt. Dieser Beweis erhielt aber nur dann erst seine letzte und volle Gültigkeit, wenn in der ganzen Lymphknotenkette auch nicht eine Lücke bestand. So wurden in den früheren Jahren für die Entstehung der Halslymphdrüsentuberkulose alle möglichen Hypothesen in Anspruch genommen. Erst allmählich ist uns über die Entstehung dieser besonderen Lokalisation der Tuberkulose Aufklärung gebracht worden und völlige Klarheit in das bis dahin dunkle Gebiet.

Die Halsdrüsentuberkulose, ist immer die Manifestation einer sekundären Tuberkulose, die durch Eindringen von Bazillen vom Quellgebiet jener Drüsen aus verursacht worden ist. Ist ein primärer Lokalfekt in der zu der Drüse gehörigen Körperpartie nicht aufzufinden, so bezeichnet man das Drüsenleiden als primäre Lymphdrüsentuberkulose. Jedoch handelt es sich hier auch nur um ein scheinbar primäres Entstehen; denn die ursprüngliche lokale Affektion kann so versteckt liegen, daß sie selbst bei der sorgfältigsten Untersuchung übersehen wird oder sie kann auch schon ausgeheilt sein zu der Zeit, in der die Drüenschwellung bemerkt worden ist.

Die Infektionsgefahr, der der Mensch vom Anfang seines Lebens ausgesetzt ist, droht im von zwei Seiten:

1. vom erkrankten Mitmenschen (Typus humanus)
2. vom infizierten Rind (Typus bovinus).

Obwohl nun eine Infektion durch den Typus bovinus relativ seltener vorkommt, so darf sie unter keinen Umständen vernachlässigt oder außer Acht gelassen werden, denn zum Teil wurde uns die Skrofulo-Tuberkulose erst durch die genauere Kenntnis der Bovininfektion verständlich. Und gerade das Kind ist es, das am meisten den Infektionsquellen, wie z. B. Milch von tuberkulosen erkrankten Tieren, auch hier ausgesetzt ist.

Die weitaus größere Gefahr der Ansteckung von Tuberkulose droht dem Menschen von seinem tuberkulösen Mitmenschen. Ein kurzes Zusammensein eines Kindes mit einem Bazillenträger genügt um eine wirksame Infektion zu vermitteln.

Als Hauptpforten, die der Tuberkel-Bazillus betritt, um in den kindlichen Organismus zu gelangen, können wir die oberen Luft- und Verdauungswege annehmen, und vor allem wird es der Mund sein, der die Infektion vermittelt. Ist nun der Tuberkel-Bazillus durch Mund und Nase aufgenommen, so sind die verschiedensten Wege vorhanden um weiter zu wandern. Und so unterscheiden wir nun einen haematogenen und lymphogenen Infektionsmodus.

Ueber die Bedeutung des haematogenen Infektionsweges äußert sich aber Most: „Es ist bekannt, daß eine klinisch manifeste Drüsentuberkulose oft der einzige Ausdruck einer tuberkulösen Infektion ist. Dies spricht schon mit großer Wahrscheinlichkeit gegen den haematogenen Infektionsgang. Sodann müßte die Lokalisation der Drüsentuberkulose viel häufiger die bunte Manigfaltigkeit haematogener Metastasen überhaupt darbieten und nicht den beobachteten von der Peripherie des Körpers zentralwärts und etappenweise fortschreitenden Gang der Infektion zeigen.“ Auch Cornet weist auf die so oft isolierten tuberkulösen Halsdrüsen hin, bei denen sonst im ganzen Körper keine Spur von Tuberkeln sich befindet. Es sind also keine Bazillen ins Blut gelangt, obwohl sich wieder Baumgarten auf Grund seiner Experimente zu einer gegenteiligen Ansicht gezwungen sah und auch Harbitz glaubt, daß der Annahme einer Infektion durch das Blut nichts im Wege stehe.

Anders steht es nun mit dem lymphogenen Infektionsmodus. Bei der Weiterverbreitung und Infektion des Tuberkelbazillus spielt das Lymphgefäßsystem wegen seiner Funktion und topographischen Anordnung eine äußerst wichtige Rolle.

Da nun der Hals, die drüsenreichste Region des Körpers, zahlreiche lymphatische Verbindungen nicht nur mit der Haut des Gesichtes, sondern auch mit der Schleimhaut des Mundes, der Nase und des Rachens u.s.w. aufweist, so ist es nicht schwer, an den Uebergängen der äußeren Haut zu den Schleimhäuten der Nase, des Mundes, des Auges oder des Ohres eine Infektion hervorzurufen, da beim Kind diese an sich schon gefährdeten Stellen durch Reiben, Kratzen, Bohren oder durch Berührung mit infizierter Nahrung die verschiedensten Infektionen gewissermaßen erzwungen werden. Besonders die chronischen der exsudativen Diathese angehörigen Ekzeme scheinen von besonderer Bedeutung zu sein.

Eine Lieblingsstelle der skrofulösen Infektion bilden die Lippen, weil sie äußeren Verunreinigungen besonders ausgesetzt sind. Sie werden von Kindern geradezu als Wischtuch für ihre

unsauberen Finger gebraucht und umschließen schmutzig in den Mund eingeführte Gegenstände. Gut kann man eine Infektion vorstellen, infolge von Substanzverlusten der Schleimhaut der keimreichen Mundhöhle oder der epidermoidalen Decke, die in der Region der Kiefer- und Halslymphdrüsen gehörigen Oberhaut zustandekam.

Wichtig erscheint hier auch die Schleimhaut des Kiefers und die Zahnkaries zu sein, die in diesem Falle die Faktoren sind, die eine Brücke von Primärinfektion zu einer Halsdrüsentuberkulose darstellen. Bei der Kieferschleimhaut sind Nischen und Buchten an und zwischen den Zähnen vorhanden, die den Keimen Halt und Gelegenheit zur Weiterentwicklung geben können. Auch die klinische Erfahrung zeigt im allgemeinen die Häufigkeit von Infektionen, die von der Kieferschleimhaut ausgehen. Da nun weiter die Zahnkaries bei Kindern außerordentlich verbreitet ist, so ist die Kenntnis dieses Infektionsweges von großer Wichtigkeit. Bei 346 Kindern mit Karies der Zähne fand Odenthal eine davon abhängige Schwellung der Submaxillardrüsen. Berton stellt sogar eine vollkommene Uebereinstimmung nicht nur der Lage, sondern auch der Intensität der Drüenschwellung mit der betreffenden Karies fest. Die gleich strenge lokale Abhängigkeit der Drüenschwellung von dem Sitz des kariösen Zahnes, mit dem sie nicht nur in der Körperseite, sondern auch darin übereinstimmt, daß bei Karies der Molaren die Drüsen in der Gegend des Kieferwinkels, bei Karies der Schneidezähne diejenigen weiter vorne geschwollen sind, hebt Starck hervor. Tuberkulöse Schwellung und Verkäsung der gleichseitigen Halsdrüsen im Anschluß an einen kariösen Molaren und eine 6 Monate nach dem ersten Auftreten der Schwellung eintretende Lungentuberkulose sah Garwitz. Cornet demonstrierte in der Tat Hunde, denen er mit einem stumpfen Instrument am Schneidezahn Verletzungen beigebracht und die Defektstellen mit Bakterien eingestrichen hatte. Hierauf vergrößerten sich die regionären Hals- und Kieferdrüsen und verkästen allmählich. Falls jedoch in einem kariösen Zahn, von dem eine tuberkulöse Drüenschwellung ausging, Tuberkelbazillen selbst nicht mehr nachgewiesen werden können, so müssen wir mit Miller entgegen: „In einer verfaulten Zahnpulpa findet man häufig keine entwicklungsfähigen Bakterien mehr, da die Pilze infolge des Verbrauches von Nährmitteln zu Grunde gehen oder durch ihre eigenen Produkte getötet werden.“

Weiter finden sich häufig im Naseninnern Tuberkelbazillen. Auf die mehrmalige Heilung skrofulöser Halsdrüsenentzündung durch einfache Behandlung der Nase weist schon A. Jakobi hin.

So überzeugt sich Cornet, daß die Nasenschleimhaut von Meerschweinchen mit ihr in Berührung gebrachten Tuberkelbazillen ohne jede Schwierigkeit den Durchtritt gestattet und daß sich dadurch eine typische Infektion der submaxillaren Drüsen erzeugen lassen. Der inhalierte Luftstrom streicht nun nach Choanen hin zum Nasenrachenraum und trifft im Rachenraum mit der oberen Verdauungswegen zusammen. Hier droht also von zwei Seiten Infektionsgefahr. Diese wird aber noch durch ein an dieser Stelle befindliches Organsystem erhöht, das sowohl durch seinen anatomischen Aufbau wie durch sein funktionelles Verhalten bis zu einem gewissen Grad besonders für die Infektion geeignet ist. Es ist dies der Waldeyersche lymphatische Rachenring. So wurden in den Gaumen-, wie in den Rachentonsillen Tuberkelbazillen häufig gefunden. Zuweilen wurde auch die Frage aufgeworfen, ob die Tonsillen gelegentlich die Eingangspforte für die tuberkulöse Infektion darbieten können, ohne selbst tuberkulös zu erkranken. Mit aller Wahrscheinlichkeit ist diese mit „Nein“ zu beantworten; denn Friedemann ist es nicht gelungen, in nicht tuberkulösem Gewebe Tuberkelbazillen zu finden. Einige Autoren wurden sogar verleitet, die Tonsillen als fast ausschließliche Eingangspforte des tuberkulösen Virus für die Halsdrüsen anzusprechen, obwohl sie wieder auf der anderen Seite in früheren Jahren als beinahe immun gegolten haben.

Bei der Tuberkulose der Conjunctiva, Cornea und auch der Iris sind gewöhnlich die Kiefer- und Halsdrüsen ausschließlich oder vorwiegend auf der erkrankten Seite tuberkulös affiziert. So waren bei einer zum Teil schon abgelaufenen tuberkulösen Ulceration der Tarsalbindehaut des linken Auges die linken Halsdrüsen stark geschwollen (Sattler). Die Speicheldrüsen, Halslymphdrüsen und das Unterkiefergelenk sind nach Ferreri besonders im Kindesalter bei krankhaften Prozessen des Ohres nicht so selten mit affiziert. Im deutschen pathologischen Institut in Prag kam 1913 ein Fall eines 3 Monate alten Kindes zur Sektion, der eine käsige Tuberkulose der rechten Tuba auditiva und des rechten Mittelohrs zeigte, dabei fand sich eine käsige Lymphadenitis der bis erbsengroßen rechten prae- und infraauricularen Lymphknoten des rechten submaxillaren und bis bohngroßen rechten cervicalen Lymphdrüsen.

Eine Infektion durch die äußere Haut an Kopf und Hals tritt im Vergleich zu den geschilderten Hauptinfektionswegen vollkommen in den Hintergrund. Denn der Unterschied zwischen der Empfänglichkeit und damit der Erkrankungsfähigkeit der Cultis und derjenigen der äußeren Schleimhäute ist ganz erheb-

h. Albrecht jedoch ist es gelungen, einen Fall mitzuteilen, den ganz bewußt als Hautprimärkomplex darstellt. Dabei waren die rechtsseitigen Halslymphknoten zu mächtigen Tumoren angeschwollen.

Die Annahme, daß nun die Skrofulo-Tuberkulose eine erbliche bzw. angeborene Krankheit sei, war für manche Forscher allein maßgebende Punkt und der beste Beweis für ihre Ursache. Ein Beispiel für diese Erbllichkeit ist Lugol; für ihn ist die „einzige und die allgemeine Ursache, die wir beweisen können“. Er läßt keine Ausnahme vom Gesetz der Erbllichkeit gelten.

Zur Erklärung der angeborenen Uebertragung kann man zwei aufgestellte Theorien unterscheiden:

1. Die eigentliche Übertragung, die zerfällt

- a) germinative
- b) plazentare.

2. Vererbung der Disposition.

Eine germinative Uebertragung von Seite des tuberkulösen Vaters hat zur Voraussetzung, daß sich im Sperma Tuberkelbazillen vorfinden lassen. Weibel nimmt aber an, daß ein eventuelles Eindringen von Tuberkelbazillen nach der Imprägnation die weitere Differenzierung und das Fortleben des Eies unmöglich machen müßte. Demnach kommt für das Säuglings- und Kindesalter im strengen Wortsinn die germinative Infektion zum — man kann sagen wohl überhaupt nicht — in Betracht. Für eine Latenz der Tuberkelbazillen in einer Keimzelle im Sinne von Baumgarten liegt bis jetzt noch kein Beweis vor. Wenn Baumgarten meint, daß die Gewebe während der fötalen Entwicklung infolge ihrer Wachstumsenergie den Tuberkelbazillen einen größeren Widerstand entgegensetzen, so ist es doch sonderbar, daß wir diesen Widerstand bei der Tuberkulose finden, während wir ihn doch bei erblicher Uebertragung anderer Infektionskrankheiten, wie hauptsächlich der Syphilis vermissen.

Anders verhält es sich bei der plazentaren Uebertragung. Die normale Plazenta, die ein undurchdringliches Filter bildet, kann allem Anschein nach einen Uebertritt von Tuberkelbazillen nur dann in den fötalen Organismus gewähren, wenn sich in ihr selbst ein tuberkulöser Herd befindet. Freilich spielt sie als Ursache der tuberkulösen Halsdrüsenanschwellungen keine bedeutende Rolle, da es sich in der Regel um eine hochgradige Tuberkulose oder allgemeine Miliartuberkulose der Mutter handeln muß. Als Ursache der Skrofulo-Tuberkulose durch plazentare Uebertragung des Keimes spricht auch noch dagegen, daß sich

ihr Sitz vorwiegend in den Halsdrüsen befindet, während bei plötzlicher Uebertragung, die als Eingangspforte in Betracht kommenden Organe die Leber und die Drüsen an der Porta hepatica zuerst erkrankt sein müßten.

Eine weitere Frage, und auch nicht unwichtige, spricht die erbliche Disposition als Ursache an. Hier wird also nicht der Tuberkelbazillus, sondern nur eine gewisse Disposition zur Skrofulo-Tuberkulose übertragen. Selbstverständlich wird damit niemand einen hereditären Einfluß ableugnen können, wenn die betreffenden Kinder dem Kreise ihrer Eltern und Verwandten entrückt waren und eine sonstige Infektionsgefahr nicht möglich war, wie wir auch eine gewisse, bereits erwähnte, anatomische Eigentümlichkeit z. B. in der Haut und den Lymphgefäßen, die wir als skrofulöse Anlage anzusprechen pflegen und die sich von den Eltern auf die Kinder vererben kann, nicht in Abrede stellen können. Es können hier mehrere Jahre vergehen, bis die Krankheit ausbricht. Nach Virchow besteht dann eine Praedisposition. Er schließt in solchen Fällen: daß die Gewebe, die einen bestimmten Teil des Körpers zusammensetzen, nicht ganz glücklich gebildet sind, daß sie in der Weise eingerichtet sind, daß sie bei gewissen äußeren Einwirkungen, bei gewissen Störungen, die sie erfahren, nicht mehr in vollkommener Ordnungmäßiger Weise ihre Störungen ausgleichen, ihren Zustand regulieren können.“ Nach Hauser hängt die Empfindlichkeit eines Organismus gegenüber einem Infektionserreger im wesentlichen davon ab, in welchem Maße die giftigen Stoffe einwirken und von dem Grade der Energie, mit welchem die zur Verfügung stehenden Schutzvorrichtungen funktionieren. Die Möglichkeit, daß eine solche spezifische Empfindlichkeit der Gewebe gegenüber dem Tuberkelvirus sich als erbliche Eigenschaft einer Generation hindurch erhält, sich sogar eventuell steigern kann, ist für sich anzunehmen. Von den Geweben sind ganz besonders die Schutzdecken, die Epithelien geschwächt, „sie zeigen eine größere Vulnerabilität“, die selbst wenn sie auch makroskopisch völlig intaktscheinen, gegen das Eindringen der tuberkulösen Noxe nicht der Art schützend wirken, wie es bei Kindern ist mit normaler Epithel, die von gesunden Eltern abstammen. Bei den skrofulösen Lymphdrüsentuberkulose erkrankten oder zu derselben neigenden Kindern finden wir recht häufig diese Voraussetzung bestätigt, indem sich uns die große Neigung zu chronischen Erkrankungen der Haut und der Schleimhaut immer wieder darbietet. Hiervon spricht dann v. Pfaundler mit Recht von einer Abart oder Minderwertigkeit, wenn man bei der Einwirkung von natürlichen, son-

aum pathogenen Reizen, bei einem Individuum einen vermehrten und ungewöhnlichen „Aufwand von Krankheitserscheinungen“ beobachten kann. Gerade diese „Anfälligkeit“ kennzeichnet die exsudative Diathese.

Aber auch durch eine Reihe äußerer Momente wird die Entwicklung und Verbreitung der tuberkulösen Skrofulose noch beeinflusst. So spielt in erster Linie die soziale Lage unter den störenden Einflüssen eine wichtige Rolle. Wenn auch skrofulöse Erkrankungen in allen Kreisen vorkommen, so sind doch die ärmeren Schichten bevorzugt. Je enger und dichter die Menschen aneinander wohnen, umso größer ist der Keimreichtum und desto leichter gelangen dann Bakterien an den Körper und siedeln sich an den zarten kindlichen Häuten an. Dunkle Räume kann man ohne weiteres als Brutstätte der Skrofulose bezeichnen. Unreinlichkeit trägt ganz erheblich zu ihrer Entstehung bei. Dies sind alles Schäden der Umwelt der Kinder, die v. Pfaundler unter dem Ausdruck: „Pauperismus“ zusammenfaßt. Auch Jamin glaubt, bei aller Wahrung der nicht bestreitbaren individuellen Besonderheiten, die Entzündungsbereitschaft des Skrofulösen in jedem Einzelfalle doch ganz gut durch die erhöhte Allergie der Kinder-tuberkulose im Sekundärstadium unter Mitwirkung manigfacher Umweltschäden bei mangelhafter Pflege“ begründen zu können.

Ein weiteres wichtiges Moment dürfte eine weitere ungenügende, einseitige oder unzweckmäßige Ernährung sein. Es liegt nahe anzunehmen, daß die Steigerung der an sich schon vorhandenen kindlichen Lockerung der Gewebe unter dem Einfluß ungünstiger bzw. mangelhafter Ernährungsverhältnisse zustandekommt (z. B. bei Avitaminosen, Unterernährung). Besonders Czerny hat gezeigt, in welchem Maße unzweckmäßige Ernährung, vor allem die Milchmast, eine vorhandene Diathese zu Entzündungen drängen kann. Selbst bei günstiger Erbanlage kann Avitaminose verschiedener Art erhöhte Krankheitsbereitschaft hervorrufen. Vollwertig ist auch nicht eine Nahrung, die bei Anwesenheit aller erforderlichen Bestandteile durch einseitiges Uebermaß von Milch oder von Kohlehydraten, was Jamin als „Sperrnahrung“ bezeichnet, zusammen mit verkehrten Ernährungsgeohnheiten unentbehrliche und wertvolle Nährmittel gleichsam aus dem Haushalt des Körpers drängt.

Manche Autoren wollen eine gewisse Ursache bei mangelhafter Körperbewegung sehen. Wieder andere glauben bei der Verbreitung in Stadt und Land erhebliche Unterschiede zu Ungunsten der Stadtbevölkerung machen zu müssen. Nicht ganz ohne Einfluß könnte auch die Jahreszeit sein, indem der Winter

durch den häuslichen Aufenthalt eine gesteigerte Gelegenheit zu Infektion gibt, die sich dann nach Wochen oder Monaten durch eine Drüsenaffektion äußert. Besonders akute Exantheme, wie Masern, begünstigen einen Ausbruch der Skrofulose. Dieselben wirken in zweierlei Richtung disponierend für die Tuberkulose, einmal dadurch, daß sie zu Drüsenschwellungen am Halse führen und dadurch, daß sie die Widerstandskraft des Körpers im allgemeinen herabsetzen. Als weitere Gelegenheitsursache wird das Trauma angesehen. Verletzungen der äußeren Haut, Insektenstiche und Kratzwunden öffnen dem Tuberkelbazillus die Eingangspforte.

Die Aufgaben, die nun die Behandlung der tuberkulösen Lymphknotenschwellungen stellt, sind vor allem, jede, auch nur vorübergehend chronische Reizung, des praedisponierten Gewebes fern zu halten. Daher ist jede bestehende Reizung, jeder Katarrh, jede Entzündung äußerst sorgfältig zu überwachen, falls sie einmal vorhanden ist. Meist lassen auch derartige Reizungen der Haut und Schleimhaut ohne weiteres nach, wenn unter guter Pflege die Verunreinigungen, Eiterinfektionen und die Parasitenplage wegfallen. Weiterhin muß vor allem Schonung der vorhandenen Kräfte und ständige Ueberwachung des Körperzustandes verlangt werden. Am besten ist das Kind in eine für seine Bedürfnisse passende Umwelt zu versetzen. Bei der Nahrung muß auf einen hohen Nährwert bei gleichzeitig geringer Mengenzufuhr Gewicht gelegt werden. Fettreiche Nahrung ist hier besonders angezeigt und großer Bedeutung ist die Zufuhr von fettlöslichen Vitaminen und von Ergänzungsnährstoffen beizumessen. Und so war Lebertran bei den skrofulösen Krankheitserscheinungen ein beliebtes Heilmittel. Außerdem sind mäßige Bewegung, Aufenthalt im Freien von anerkanntem Wert.

Beispiele von Krankheitsfällen aus der Kinderklinik Erlangen

Fall 1: J., Karl, 11 Jahre.

Seit Jahren werden ständig Drüsenschwellungen am Hals beobachtet, die gelegentlich aufbrechen, Eiter absondern und sich schließen unter Narbenbildung. Dabei immer schlechtes Aussehen. In der Gegend unter dem Kinn, hinter den Ohren und in der oberen Brustgegend Drüsenschwellungen mit eitrigem Sekret und zum Teil mit dicken Krusten. 8 Tage lang mittleres hohes Fieber.

Diagnose: Drüsentuberkulose mit ausgedehnter Fistelbildung.

3. II.: Einige Drüsen unter dem rechten Kieferwinkel sezernieren Eiter. Pirquet sofort nach der Anlegung Rötung.
7. II.: Man hat den Eindruck, daß die hochrote Färbung der Narben- und Drüseneiterungen allmählich erblaßt.
9. III.: Am Unterkiefer bestehen 6 mit dicken Krusten belegte Geschwüre, Fisteln mit stark geröteter Umgebung. Hinter dem Ohr taubeneigroße derbe Drüse, auf die Fisteln Ektebinsalbe.
1. III.: Heute weniger Sekretion aus den Fisteln, Krusten sind erweicht und lassen sich leicht abziehen. Salbenverband.
2. III.: Mehr schmierig-eitrige Sekretion, Fisteln flach und weich überkrustet, in ihrer Umgebung Eiterknötchen auf stärker gereizter Haut. Lyssiasalbenverband.
4. III.: Fisteln schmierig gelb belegt, Bläschen und Rötung zurückgegangen.
4. III.: Fisteln fast geschlossen, sezernieren nur gering, Bildung von frischen roten Granulationen.
6. III.: Drüse hinter dem rechten Ohr langsam größer.
8. III.: Alle Fisteln geschlossen und vernarbt. Punktion der Drüse hinter dem rechten Ohr: gelblicher Eiter, verkäste Massen und auf Druck noch Blut.
10. III.: Vor dem rechten Ohr Anschwellung einer Drüse zur Mandelgröße.
1. IV.: Drüse vor dem rechten Ohr schwillt langsam mehr an.
3. IV.: Drüse hinter dem rechten Ohr sezerniert etwas blutigen Eiter ab.
4. IV.: Drüse hinter dem rechten Ohr gerötet, gegen Haut und Knochen verschieblich, nicht druckempfindlich.
5. IV.: Operative Entfernung der Drüse.
10. IV.: Drüse hinter dem linken Ohr platzt auf Druck, entleert blutigen Eiter. Die alten Fisteln beginnen wieder etwas zu sezernieren. Verband mit Jodex.
5. IV.: An den Unterkiefernarben bilden sich immer wieder feine Krusten. Jodexverband.
12. IV.: An allen alten Narben Rötung und Eiterknötchen. Lyssiasalbe.
14. IV.: Narben jetzt schmierig belegt, teils leicht blutend. Tuberkulin-Injektionsquaddel stärker rot.
16. IV.: Fisteln heilen gut ab, sind trocken und vernarbt; was die Lyssiasalbe bewirkte.
19. IV.: Nur aus zwei Fisteln noch geringe schmierige Sekretion.

2. V.: Geringe schmierige Sekretion aus der Fistel an der linken Halsseite. Fistel rechts fast geschlossen. Lyssiasalbenverband.
5. V.: Fistel rechts geschlossen. Linke Fistel nach Abziehen der Kruste schmierig belegt. Tuberkulose-Injektionsstelle etwas blasser.
9. V.: Neue Fistel links oberhalb hinter dem linken Ohr zwei neue nässende Fisteln am Hals vorne. Vor links am Hals derbe walnußgroße Drüse zu tasten. Auf die Drüse hinter dem linken Ohr Jodanstrich. Lyssiasalbe.
11. V.: Fisteln hinter dem Ohr sezernieren eitriges Sekret. Abends trockener Verband.
12. V.: Entfernung der Drüse hinter dem linken Ohr.
17. V.: Vor der Wunde punktförmige eitrigte Stellen. (Fisteln)
18. V.: Die Stelle ist schmierig belegt.
31. V.: Haut im ganzen Drüsenbereich gerötet, am Hals rechts und links je eine Fistel, die blutet. Lyssiasalbenverband.
8. VI.: Am Hals rechts noch zwei offene Hautstellen, die sezernieren.
19. VI.: Fisteln am Hals alle geschlossen, Haut im Drüsenbereich noch gerötet, dünn und schuppig. Vor dem linken Ohr ist die Haut über eine tastbare nicht druckempfindliche schmerzhaft ziemlich derbe Drüse blaurot verfärbt.
26. VI.: Drüse vor dem linken Ohr fühlt sich weich an, keine Schmerzen.
27. VI.: Punktion der Drüse links vor dem Ohr. Einlegen eines Streifens Jodoformgaze.
29. VI.: Aus ihr entleert sich dicker blutiger Eiter nach Entfernung des Tampons.
12. VII.: Inzisionswunde geschlossen.
24. VII.: Entlassungsbefund: Hochrote Narben am Hals unter dem Kinn, von einem Ohr zum andern reichend, keine Fisteln mehr, Herz und Lunge o. B., guter Ernährungszustand.

Dieser Fall zeigt sehr deutlich das mannigfache Bild, das die Drüsentuberkulose darstellen kann. Wir sehen hier, wie sich die Stadien und Phasen der Krankheit an den einzelnen Drüsen im Laufe von vielen Monaten zu entwickeln pflegen. Ja — wir können hier sogar feststellen — kann sich ein derartiger Prozeß oft Jahre hinziehen. Wir sehen, wie bereits an einer Gruppe bereits Vernarbung eingetreten ist, während die zweite eitert und ulceriert und die dritte erst anschwillt. Zur Therapie

wurden Salbenverbände angewendet und zwar Ektebin- und Lysalbe.

Fall 2: O., Georg, 9 Jahre.

Sah blaß aus, hatte morgens öfter Erbrechen, schlechter Appetit. Kam nach festgestelltem Nierenleiden in poliklinische Behandlung, bekam salzlose Kost, viel Tee. Da das Kind dauernd blaß aussah und sich nicht erholte, wurde es in die Kinderklinik aufgenommen.

Allgemeiner Eindruck: blasser Junge mit etwas stumpfen Gesichtsausdruck.

Diagnose: Drüsentuberkulose bei schlechtgepflegtem und -genährtem Kind.

3. I.: Seit gestern Schwellung der linken Wange am Unterkiefer. Klagt über Zahnschmerzen. Zahnextraktion.
4. I.: Kind erholt sich zusehends. Da die Pirquetinjektion stark positiv ausfiel, Einleitung der Tuberkulose-Behandlung.
5. I.: Weitere Besserung des Allgemeinbefindens, Lunge ohne krankhaften Befund. Keine Temperatursteigerung.
6. II.: Gutes Aussehen. Stetige Gewichtszunahme bei Tuberkulosebehandlung.
7. II.: Wird in gutem Allgemeinzustand zur ambulanten Weiterbehandlung nach Hause entlassen.

Hier handelte es sich um eine Drüsenschwellung, die nur am linken Unterkiefer festzustellen war. Fieber hatte der Junge während seines 4 wöchigen Aufenthaltes in der Kinderklinik nicht. Bemerkenswert ist aber bei diesem Fall, daß es sich um ein schlecht gepflegtes und auch mangelhaft genährtes Kind handelt. So sehen wir hier das bestätigt, was bereits früher erwähnt wurde, daß nämlich Unreinlichkeit, sonstige Umweltschäden („Pauperismus“) ganz erheblich zur Entstehung von Drüsenschwellungen beitragen können. Weiterhin sind auch die mangelhaften Ernährungsverhältnisse von Bedeutung. Durch Förderung eines Allgemeinzustandes konnte der Junge bereits nach 4 Wochen nach Hause entlassen werden.

Fall 3: Sch., Kurt, 3 Jahre.

Der Junge litt bereits 1934 an schwerer rezidivierendem Erysipel an Genitalien, Beinen, Rücken und Armen und war deshalb über 8 Wochen in der Kinderklinik. Er wurde damals in

gutem Allgemeinbefinden mit weiterer ambulanter Beobachtung entlassen. Bereits $\frac{1}{2}$ Jahr später wurde er wieder der Kinderklinik wegen starker Bronchitis überwiesen, Damals waren 14 Tage zur Behandlung notwendig. Die damalige Beurteilung lautete, pastöses, blasses und gedunsenes Kind, überfüttert mit Milchnährschäden. Es wurde gesund entlassen mit der Kostvorschrift wie bisher in der Klinik: Vig. Lebertran 1 mal tägl, $\frac{1}{2}$ T.L. Calc. lact. 3 mal tgl. $\frac{1}{2}$ T.L. Bereits anfangs 1935 mußte er wieder 4 Tage wegen fieberhafter Bronchitis aufgenommen werden. Am 16. Oktober 1936 kam er abermals zur Behandlung in die Kinderklinik, nachdem ihn die Stadtklinik für innere Krankheiten wegen Drüenschwellung dorthin überwiesen hatte.

Diagnose: Symptome am Hals, Grippe.

Vor 10 Tagen Bronchitis, 1 Tag lang Fieber. Am 10. November trat Schwellung unter dem rechten Ohr auf, die sich bis jetzt vergrößerte. Heute wieder Fieber, 38,4 Grad. Kein Erbrechen, kein Ausschlag, keine Schluckbeschwerden, guter Appetit.

16. X.: Von der Poliklinik überwiesen an der rechten Halsseite mächtige Drüenschwellung, derb und etwas schmerzhaft. Haut darüber braun verfärbt, schuppt ab, entzündet. Es werden nur trockene Verbände angelegt. Hals und Rachen kein path. Befund.
22. X.: Drüenschwellung geht rasch zurück, Haut heilt darüber gut, Drüse noch ca. bohngroß, Rachenabstrich negativ.
26. X.: Seit zwei Tagen Katarrh, Temperatur 39,4 und geringes Husten. Allgemeinbefinden sonst nicht gestört, isst und trinkt und ist munter.
31. X.: Entlassen, ambulante Behandlung.

Der Junge, dessen Drüsen auf der rechten Halsseite mächtig geschwollen waren, hatte während seines 14tägigen Aufenthalts in der Klinik fast immer Fieber. Das Auffallende an diesem Fall ist, daß bei dem Kind, als es früher schon in der Klinik mit Milchnährschäden vorlag und damals wie heute ein pastöses, gedunsenes Aussehen auffiel. Daß gerade derartige Kinder zu Drüenschwellungen neigen, ist schon vorher gesagt worden. Wesentlich unterstützt werden kann dieser Zustand, wie wir wissen, durch unzweckmäßige Ernährung, wie vor allem durch die hier vorhanden gewesene Milchmast. Zur Heilung wurden nur trockene Verbände angelegt.

Und so können wir aus diesen Krankheitsfällen ersehen, wie langwierig eine derartige Erkrankung sein kann und wie abwechslungsreich sich das Bild an der betroffenen Körperstelle zu gestalten vermag. Wir finden weiterhin bestätigt, wie Unreinlichkeit

keit und Nahrungsschäden auf dieses Leiden fördernd wirken. Zusammenfassend seien dann hier noch anschließend die Hauptmerkmale der Drüsentuberkulose aufgezählt: Jungendliches Alter, ein Lieblingssitz tuberkulöser Drüsen: das Halslymphgebiet, der chronische Verlauf, das allmähliche Anwachsen zu größeren Tumoren mit den periadentischen Verwachsungen, sodaß sich die einzelnen Drüsenkörper nicht mehr palpatorisch differenzieren lassen. Ihrem sukzessivem Entstehen und ihrem verschiedenen Zustand entsprechend, zeigen sie an den verschiedenen Stellen eine wechselnde Resistenz von Verstärkung bis zur Erweichung und Fluctuation. Besonders die erweichten und dem Aufbruch nahen Stellen sind der Haut adhärent. Stromabwärts finden sich dann die kleinen beweglicheren Drüsen, die den absteigenden Charakter des Drüsenwachstums in typischer Weise zeigen. In der Tat findet man zuweilen so kleine und unscheinbare Drüsen vor, daß man sie erst mit dem tastenden Finger suchen muß. Dagegen treten uns aber auf der anderen Seite wieder mächtige Geschwülste entgegen die den Hals zu beiden Seiten vom Ohr bis zum Schlüsselbein sowie die ganze Kinngegend polsterartig ausfüllen. In diesem Stadium verwischen die Konturen des Unterkiefers. Bei den Trägern derartiger bilateraler Lymphome entsteht der dicke, volle Hals, wie man ihn z. B. beim Schwein findet, ein häßlicher Vergleich, der aber der Skrofulose ihren Namen gegeben hat.

Jedenfalls muß immer die Prognose einer tuberkulösen Lymphdrüsenentzündung ernst gestellt werden, durchaus aber nicht ungünstig. Verschiedene Dinge spielen eine wichtige Rolle, die eine Krankheit in ein besseres Licht stellen können, die sie aber in jeder Weise verschlimmern können. So ist es also nicht unwichtig, welche Form der Drüsentuberkulose wir vor uns haben. Von äußerster Bedeutung ist dabei der Allgemeinzustand des Erkrankten. Anämische, schwächliche Konstitution oder gar anderweitige tuberkulöse Herde im Körper werden die Prognose ebenso trüben, wie ein sonst gesunder und kräftiger Organismus berechnigte Hoffnung auf eine größere Widerstandskraft der tuberkulösen Infektion gegenüber gibt. Beim Aufbau solcher Widerstandskraft kommt es natürlich auch auf die Umweltverhältnisse an. Aussicht auf einen erfolgreichen Heilungsvorgang kann sich nur unter Lebensbedingungen eröffnen, die alle Ansprüche des Körpers bei erhöhtem Bedarf befriedigen, z. B. auch durch Zufuhr von Fett und Lipiden, von Aufbau- und Schutzstoffen.

Ferner darf auch die Lokalisation der affizierten Drüsen nicht übersehen werden und endlich ist es auch nicht gleichgültig, in welchem Stadium überhaupt schon die Erkrankung steht.

Viele gesunde Erwachsene hatten in ihrer Jugend Drüsen und oft kann man stark herangewachsene Männer und Frauen mit den allerbesten Lungen sehen und aus den tiefen und weiten um den Hals verbreiteten Narben derselben kann man sich überzeugen, daß sie in ihrer Kindheit lange und viel an skrofulöse Drüsenschwellungen gelitten. Wenn nun auch Escherich die rein durch tuberkulotoxische Integumentsveränderungen auftretende Skrofulose die harmloseste Form der infantilen Tuberkulose nennt, die sogar einen gewissen Schutz gegen späte tuberkulöse Infektion bildet, so beherbergt sie doch Tuberkelbazillen und kann vielleicht recht häufig die Quelle für die Aussaat der Bazillen in das Blut und in andere Organe bilden.

Die Komplikationen der Halsdrüsentuberkulose hängen von ihrer Form, ihrem Umfang und letzten Endes auch von ihren Sitzen ab. Druckempfindlichkeit entsteht erst bei empfindlicheren Veränderungen. Durch Druckwirkung tief in die Weichteile hineinwachsender Drüsenpakete können Bewegungsstörungen des Kopfes und des Halses, neuralgische, bisweilen auch Schluckbeschwerden auftreten. Der Druck großer Drüsenpakete kann außerdem auf Gefäße, Nerven, Trachea, Bronchien und Oesophagus zu ernstesten Zufällen, wie Lähmungen, Dyspnoe, Dysphagie, Erstickung führen. Oft kann man die Pupille der betreffenden Seite enger und die Wange stärker gerötet sehen (Sympathicuslähmung). Außerdem ist man imstande, durch Druck auf die Geschwulst nach rückwärts eine gleichzeitige Pupillenerweiterung (Sympathicusreizung) und zugleich Verlangsamung und Schwächung der Herzbewegung hervorrufen. Die Druckwirkung auf die großen Halsgefäße verursacht arterielle Hirnanämie. Gerne beteiligt sich auch die Cutis an der tuberkulösen Erkrankung in größerem Ausmaße. In der Nachbarschaft erkrankter Drüsen entwickelt sich unter der etwas emporgehobenen Epidermis spezifisches Granulationsgewebe flächenhaft mit bläulich-roter Verfärbung und charakteristischem Aussehen. Von der Geschwulstfläche wird ein dünnflüssiges, blaßgelbliches Sekret abgesondert.

Und so können wir die Drüsentuberkulose als eine wahre Plage der Menschheit betrachten, trotzdem aber ist sie bis vor nicht allzu langer Zeit etwas stiefmütterlich behandelt worden, ja noch findet man im Laienpublikum eine große Verständnislosigkeit dieser Erkrankung gegenüber und nicht selten bringt man solche Patienten erst im fortgeschrittenen Stadium zum Arzt.

Es ist daher unsere Aufgabe, eine an den Lymphdrüsen des Halses manifest gewordene Tuberkulose zur rechten Zeit und energisch zu bekämpfen und alles zu tun um das Uebergreifen

if andere Organe zu vermeiden. Die Virulenz der Bazillen muß unschädlich gemacht, die Resistenz des Körpers erhöht werden. Denn das Verhältnis der Virulenz der Bazillen und der Resistenz des Organismus entscheiden schließlich den Verlauf und den Ausgang der Erkrankung.

Ein ähnliches Bild von Lymphknotenschwellungen bieten uns Kinder, die von Scharlach befallen sind. Scharlach gehört zu den akuten Infektionskrankheiten und ist schon seit Jahrhunderten bekannt. Er beschäftigt von Anfang an die Gedanken vieler Aerzte, bleibt aber trotz der genauesten und vielseitigen Erforschung zahlreicher Gelehrter hinsichtlich des aetiologischen Moments eine unklare Krankheit. Bei keinem unter den akuten Exanthemen wirkt es so störend, daß wir den Krankheitserreger nicht sicher kennen, wie gerade bei Scharlach. Tieferes Einsteigen in das Verständnis dessen, was sich bei ihm denn eigentlich im Körper der Erkrankten vollzieht, wird fast an allen Punkten erheblich erschwert, an vielen geradezu unmöglich gemacht. Ebenso wie schon die äußere Erscheinungsform des Scharlachs eine vielgestaltige ist, so wird es auch mit seinem inneren Wesen beschaffen sein. Denn sonst wäre es kaum möglich, warum weitaus häufiger als bei all den übrigen Infektionskrankheiten einmal unter, uns als gleich erscheinenden, Bedingungen der Erkrankten in kürzester Zeit dem Vernichter erliegt, als andere Mal kaum ernstere Schädigungen erfährt. Zwischen diesen Grenzen liegt ein weites Feld mit einer Anzahl von Störungen, die fast alle Organe treffen können. Gerhardt hat die Möglichkeit erwogen, ob das, was wir Scharlach nennen, eine Krankheit, ob es nicht vielmehr eine Krankheitsgruppe ist.

Allgemein wird nun anerkannt, daß in der Rachenaffektion, in allen eitrigen Prozessen, so hauptsächlich in den Lymphdrüsen, in den Organen sowie auch im Blut von Scharlachkranken häufig Streptokokken in Reinkultur zu finden sind. Die Mehrzahl der Autoren ist nun der Ansicht, daß diese Streptokokken nur als Sekundärinfektion zu einem noch unbekannten Erreger hinzuzusetzen. Der andere Teil hält die Streptokokken selbst für die Erreger des Scharlachs, indem sie annehmen, daß der Scharlachstreptokokkus eine spezifische Art darstellt und nur morphologisch den anderen Streptokokkenarten gleich ist.

Mag nun die aetiologische Bedeutung der Streptokokken in wie sie will, jedenfalls muß unbedingt zugegeben werden, daß das klinische Bild des Scharlachs durch den Streptokokkus wesentlich beeinflußt wird und daß das Schicksal der Scharlachkranken sehr häufig durch Streptokokkenprozesse bestimmt wird.

Was das typische Scharlachbild betrifft, so unterscheidet man folgende Stadien: Inkubation, Prodromal oder Enanthem Exanthem und Desquamatio. Aber in sehr vielen Fällen unterliegt das Krankheitsbild Abweichungen. Denn je nach der Schwere des Scharlachs erkranken auch die Lymphdrüsen. Die erste Anschwellung der Lymphdrüsen des Kieferwinkels pflegt gleichzeitig mit der initialen Angina und meist auch in deutlicher Abhängigkeit von den Rachenveränderungen aufzutreten.

Weit selbständiger aber, d. h. ohne notwendige sichtbare Vor- oder Miterkrankung des Quellgebietes, unabhängig auch von der Intensität der ersten Erkrankungen, tritt nun plötzlich nach völliger oder fast völliger Abschwellung eine Neuerkrankung der angularen Lymphdrüsen auf, die durch die neuauftretende Schmerzhaftigkeit, die Mitbeteiligung anderer Drüsen, die Besonderheiten des Verlaufes einen neuen prägnanten Krankheitszustand schafft. Einseitig oder doppelseitig, gewöhnlich unter nicht ganz geringem Fieberanstieg, schwellen die Drüsen am Kieferwinkel an. Sie erreichen dann in den leichtesten Fällen Mandelgröße, überragen kaum die Umgebung und können sich innerhalb weniger Tage zurückbilden. Häufig jedoch werden sie in kürzester Zeit zu sichtbaren, walnußgroßen derben, umschriebenen schmerzhaften Tumoren. Die beginnende Heilung kündigt sich durch das Nachlassen der Druckschmerzhaftigkeit an. Neben den Kieferwinkeldrüsen werden nun besonders die Halslymphdrüsen gerne betroffen. Es kann hier die ganze Kette dieser Drüsen vom vorderen Rand des Kopfnickers bis in die Supradaviculargrube hinein, gelegentlich auch die hinteren Cervicaldrüsen zur Schwellung und Entzündung kommen. Die tiefen Halslymphdrüsen werden weniger aus seltener betroffen.

Bei diesen Lymphdrüsenentzündungen kann es zur Vereiterung und Nekrose kommen. Ueber der erweichten Drüsenschwulst rötet und verdünnt sich die Haut; der anfangs tiefliegende Eiter gelangt an die Oberfläche und durchbricht die Haut. Mit der Entleerung des Eiters ist dann der Heilungsprozeß eingeleitet und vollendet sich meist ohne Schwierigkeiten. Aber dieser relativ günstige Ausgang kann nicht in allen Fällen erwartet werden. Nicht allzuselten kommt es nicht zur Einschmelzung. Ein diffuses, pralles Infiltrat verwandelt das Halsbindegewebe mit den darin eingebetteten Drüsen in eine derbe, teigige oder brettharte Masse (Angina Ludovicii). Weiterhin können kleine Arterien und große Venen durch den andrängenden Abszeß bis zur vollständigen Blutleere komprimiert werden.

Beispiele von Krankheitsfällen aus der Kinderklinik Erlangen.

Fall 1: H., Erwin, 3 Jahre.

Vor 3 Wochen Mittelohrentzündung mit hohem Fieber 4 Tage später werden am Hals Drüenschwellungen bemerkt. Zur Klärung ist das Kind der Kinderklinik überwiesen worden. Die Submaxillardrüsen beiderseits und die Drüsen am Sternocleidomastoideus entlang sind geschwollen, derb indolent. Temp. 39°.

Diagnose: Wahrscheinlich hat das Kind ein versteckten Scharlach durchgemacht, sodaß es sich bei den Drüenschwellungen um das zweite Kranksein nach Scharlach handelt. Außerdem Otitis media purulenta sinistra et dextra.

10. IV.: Als einziger deutlicher Krankheitsbefund können die Drüsen am Unterkieferwinkel und am Sternocleidomastoideus entlang (beiderseits) festgestellt werden, die ziemlich derb, verschieblich, indolent und bis kirschgroß sind. Lingua geographica.

12. IV.: Ein Kind von der gleichen Station, auf der der Junge in der Ohrenklinik gelegen war, erkrankte gestern an Scharlach. 38 Grad Temperatur, Drüsen an Hals unverändert, auf Betasten keine Druckschmerzhaftigkeit. Sehr blaß.

13. IV.: Die Drüsen am Unterkieferwinkel sind noch im Anschwellen.

15. IV.: Nach Jodexeinreibung der Drüsen am Hals tritt wieder Temperatursteigerung mit Verschlechterung des Allgemeinbefindens ein.

18. IV.: Wieder hohes intermittierendes Fieber, Eiskravatte um den Hals.

19. V.: Drüenschwellungen gehen zwar zurück, aber immer noch Fieber, zeitweise Ohrenschmerzen.

17. V.: Temperatur fällt allmählich auf normale Höhe.

18. VI.: Als geheilt entlassen.

Bei diesem Falle machte sich also der Scharlach nicht durch seine sonstigen typischen Erscheinungen bemerkbar. Erst die später beginnende Drüenschwellung verhalf zur Diagnose. Das Kind hatte meist hohes Fieber. Nach Behandlung der Drüsen mit Jodex trat Verschlechterung des Krankheitsbildes ein mit gleichzeitigem Temperaturanstieg. Erst auf Anlegen der Eiskravatte konnte ein Zurückgehen der Drüsen beobachtet werden. Hier handelt es sich also um eine doppelseitige selbständige Neuerkrankung der Lymphdrüsen mit nicht geringem Temperaturanstieg

Fall 2: P., Karl, 1 Jahr.

Seit gestern Ausschlag am ganzen Körper. Schwellung unter dem Unterkiefer links. Am Hals links drei eingezogene Narben, einige haselnußgroße Drüsenknoten sind zu fühlen. Fieber vorhanden.

Diagnose: Scharlach mit Drüsenschwellung in der Submaxillargegend links und Abszedierung.

30. IX.: Rücken und untere Extremitäten zeigen kleinfleckiges Exanthem, typische Scharlachzunge, Tonsillen vergrößert, hochrot entzündet. Die Submaxillardrüsen links sind stark geschwollen, druckschmerzhaft.
 1. X.: Die Schwellung am Hals wird ganz prall.
 2. X.: Langsame Entfieberung. Ichthyolsalbenverband.
 4. X.: Pralle Schwellung, gerötet, Haut glänzend nach Stichinzision Entleerung von reichlich Eiter.
 5. X.: Schwellung geht zurück; nur dicht an der Stichöffnung noch derbe Schwellung.
 9. X.: Die Wunde ist wieder geschlossen; einige derbe Knötchen sind noch zu fühlen.
31. X.: Die Drüsen am Hals seitlich unter dem linken Ohr schwellen etwas an.
 1. XI.: Unter und hinter dem linken Ohr hat sich eine kleinapfelgroße derbe Schwellung in ganz kurzer Zeit ausgebildet. Fluctuation oder Rötung ist noch nicht vorhanden.
 6. XI.: Es kommt weder Rötung noch Einschmelzung zustande noch geht die Schwellung zurück.
 10. XI.: Wärme mit Leinsamensäckchen und Salbenverbände bringen ebenfalls die Geschwulst nicht zum Einschmelzen, reizen nur die äußere Haut.
 14. XI.: Noch nicht die gegebene Zeit zur Inzision. Heiße Breiumschläge werden vorgeschlagen, wenn dann keine Abszedierung, Versuch mit einer Punktion.
 16. XI.: Punktion der Geschwulst, nur Blut entleert sich, man fühlt aus der Geschwulst mehrere Knoten.
 18. XI.: Heute kann man im Zentrum eine weiche Delle eindrücken, hier abermals Punktion. Reichlich Blut tritt aus, gegen Abend entleert sich Eiter, besonders auf Druck.
 20. XI.: Schwellung ist etwas entspannt, deutlich fühlt man mehrere Knoten, durch Stichinzision wird der größte geöffnet, es entleert sich dickes Eiter.
 23. XI.: Bis auf kleine Knoten geht Drüsenschwellung zurück

5. XI.: Es ist kaum noch eine Schwellung sichtbar, nur kleine Knoten sind zu fühlen.
6. XI.: Stirn und Ohrmuschel ekzematös verändert. Drüsen-
schwellung wieder etwas stärker.
4. XII.: Am Hals links ist noch ein walnußgroßer Drüsen-
knoten zu fühlen, nicht schmerzhaft.
6. XII.: Die ekzematösen Veränderungen im Gesicht abgeheilt,
am Halse noch ein kleiner weicher Drüsenknoten, zur
Zeit starke Rhinitis. Wird als gebessert entlassen. Kein
krankhafter Organbefund, schon längere Zeit kein
Fieber mehr.

Hier finden wir während der Scharlacherkrankung Drüsen-
schwellungen auf der linken Seite. Fieber war von Anfang an
vorhanden, nach drei Tagen jedoch trat schon langsame Tempe-
ratursenkung ein. Ichthyolsalbe sowie Wärme mit Leinsamen-
äckchen führten nicht zum Erfolg. Erst auf heiße Breiumschläge
in entleerte sich aus der Geschwulst nach einigen Tagen reich-
lich Eiter, sodaß bei der Entlassung nur noch ein kleiner Drüsen-
knoten zu fühlen war.

Fall 3: F., Marianne, 3 Jahre.

Seit fünf Tagen krank, Müdigkeit, Hitze, Rötung am Ober-
körper. Am zweiten Tage 40 Grad Fieber. Submaxillar- und
sublingualdrüsen deutlich als Knoten fühlbar, pastöses Aussehen.

Diagnose: Scharlach mit heftiger Angina, am Ende der dritten
Krankheitswoche Drüsen-
schwellung am Hals seitlich
rechts.

8. IX.: Nase mit dickem eitrigem Sekret verstopft, Zunge hoch-
rot, Tonsillen taubeneigroß, mit mißfarbenen Belägen
bedeckt. Drüsen am Hals geschwollen, wenig druck-
schmerzhaft, Fieber vorhanden.
3. IX.: Tonsillen gereinigt, hochrot noch vergrößert. Drüsen-
schwellung geht zurück.
7. IX.: entfiebert, noch große Tonsillen.
4. X.: plötzlich 39,6 Grad Temperatur; Drüsen am Hals rechts
stark geschwollen, auf Druck schmerzhaft.
9. X.: Eiskravatte, keine wesentliche Besserung. Drüsen
werden jetzt mit Jodex eingerieben.
3. X.: Drüsen-
schwellung noch deutlich sichtbar, derb, leicht
gerötet, Nase ist noch verstopft, Tonsillen noch ver-
größert, das Kind überhaupt recht unreinlich.
9. X.: Schwellung der Drüsen geht zurück.
1. XI.: Als geheilt entlassen. Fieber nicht mehr vorhanden.

Bei diesem Kind, mit einem gedunsenen, pastösen Aussehen trat am Ende der 3. Krankheitswoche einseitige Drüsenschwellung auf. Hohes Fieber von Anfang an. Nachdem langsame Entfieberung eintrat, stieg die Temperatur ganz plötzlich wieder und auch die Drüsenschwellung nahm wieder zu. Als Therapie wurde Jodex angewandt, nachdem die Eiskravatte keine Besserung verschaffte. Auch hier bietet sich (ähnlich wie im Falle 1) das Bild, daß nach fast völligem Abklingen des primären Scharlachs die sich anschließende Drüsenschwellung einen neuen prägnanten Krankheitszustand schafft.

Fall 4: B., Johann, 3 Jahre.

Am 29. 5. erkrankte das Kind ganz plötzlich mit Erbrechen, Kopfschmerzen, Schluckbeschwerden und hohem Fieber. Am nächsten Tag hochroter, kleinfleckiger Ausschlag am ganzen Körper.

Diagnose: Scharlach mit Drüsenschwellungen.

- 30. V.: Tonsillen stark gerötet und vergrößert, keine Beläge
- 31. V.: Himbeerzunge, Exanthem unverändert.
- 4. VI.: Exanthem abgeblaßt, im Rachen schmierige Beläge, Nase mit Sekret verstopft.
- 6. VI.: In der Submaxillargegend und am Sternocleidomastoideus entlang derbe, indolente bis kirschgroße Drüsen. Temperatur geht zurück.
- 13. VI.: Drüsen am Hals bedeutend zurückgegangen. Eiskravatte wird weggelassen, aber sofort wieder Fieber mit abermaliger Drüsenschwellung.
- 20. VI.: Drüsen am Hals kaum mehr zu fühlen. Am Naseneingang bildet sich ein nässendes Ekzem.
- 8. VII.: Gesicht gedunsen, übersät mit roten Flecken und Knötchen.
- 14. VII.: Guter Ernährungszustand, Haut rein, gesunde Farbe. Scharlach geheilt. Keine Drüsen zu fühlen, kein Fieber.

Diese Drüsenschwellung tritt gleichzeitig mit der Erkrankung des Quellgebietes auf. Fieber hält einige Tage an. Nach Weglassen der Eiskravatte aber folgt sofort wieder ein nicht geringer Temperaturanstieg und erneutes Anschwellen der Drüsen.

Diese Fälle zeigen uns, wie eigentlich das normale Krankheitsbild — wenn man sich so ausdrücken will — des Scharlachs vielfach unter stärkeren Abweichungen an uns vorübergehen kann. Wir sehen, wie bald mehr oder weniger die Lymphdrüsen in

leidenschaft gezogen sind. Besonders Fall 1 und 3 stellen uns deutlich vor Augen, daß die Symptome des primären Scharlachs völlig oder fast ganz geschwunden sein können. Plötzlich aber entwickelt sich in der 3. oder 4. Woche unter Fieber eine Schwellung, einseitig oder doppelseitig, die außerordentlich schmerzhaft sein kann. Der Fieberanstieg erreicht — wie wir gesehen haben — nicht selten hohe Grade. Fast möchte man denken, diese Lymphdrüsenentzündung ist jetzt der letzte Angriff, den der Scharlach gegen den Körper ausführt. Gewöhnlich schwindet zuerst die Empfindlichkeit, dies zeigt an, daß die Erkrankung den Höhepunkt erreicht, bezw. überschritten hat. Dann nimmt Derbheit und Größe der Schwellung ab und unter lytischer Entfieberung mündet die Erkrankung. Schick glaubt auch feststellen zu können, daß gleichzeitig mit diesen Erscheinungen öfters eine eigentümliche Anämie und Gedunsenheit des Gesichts beobachtet werden kann. Dies würden wir auch bei der Patientin im Falle 3 finden.

Was die Therapie anlangt, so gibt Walter an, daß der Drüsen-Schwellung bei Scharlach am besten dadurch Einhalt zu gebieten sei, daß man Eisbeutel auflegt. Warme Breiumschläge sollten erst aufgelegt werden, wenn Hautrötung und Fluctuation auftreten. Weiterhin sind bei Nekrosebildung feuchte Verbände mit essig-saurer Tonerde zu gebrauchen.

Eine Tatsache ist es nun, daß Individuen mit offenen Wunden eine gesteigerte Empfänglichkeit für das Scharlachcontagium besitzen. So ist auch das skrofulöse Kind mit seinen Ekzemen, mit der entzündlichen Haut und Schleimhaut, welche schon im gesunden Zustande eine leichtere Passage Infektionskeimen gegenüber darbieten, als die der Erwachsenen einer Scharlacherkrankung besonders ausgesetzt; denn schon einfache Katarrhe der Schleimhäute, der Nase, bei denen die epithelialen Decken wohl noch vorhanden, aber doch schon aufgelockert sind, genügen um den Infektionsstoffen das Eindringen zu gestatten. Weiter wird keinem Zweifel unterliegen, daß als der wesentlichste Faktor bei der Erzeugung der Halsdrüsen-schwellungen die Streptokokkeninvasion in die mächtigen Bindegewebslager des Halses zu betrachten ist.

Zum Schlusse möchte ich nicht versäumen, Herrn Geheimen Medizinalrat Professor Dr. Jamin für die gütige Überlassung der Arbeit und die freundliche Unterstützung meinen wärmsten Dank auszusprechen.

Literatur.

- Broesike: Normale Anatomie.
 Cornet: Tuberkulose, Skrophulose.
 Engel-Pirquet: Handbuch der Kindertuberkulose.
 Escherich: Scharlach (Nothnagel spezielle Pathologie und Therapie)
 Gerhardt: Handbuch der Kinderkrankheiten.
 Hamburger: Kindertuberkulose.
 Hammelmann: Med. Diss. 1932, Kiel.
 Harbitz: Untersuchungen über die Häufigkeit, Lokalisation und Ausbreitungswege der Tuberkulose, insbesondere mit Berücksichtigung ihres Sitzes in den Lymphdrüsen und ihres Vorkommens im Kindesalter.
 Hauser: Zur Vererbung der Tuberkulose (Deutsches Archiv für klin. Med. 1898).
 Jamin: Die Skrofulose. Münch. med. Woch. 1926, Nr. 7.
 Kohler: Med. Diss. 1918, Berlin.
 Krückmann: Über die Beziehungen der Tuberkulose der Halslymphdrüsen zu der der Tonsillen (Arch. f. path. Anatomie u. Physiologie und für klinische Medizin. Herausgegeben v. Rud. Virchow), Bd. VIII.
 Most: Chirurgie der Lymphgefäße und der Lymphdrüsen.
 v. Pfaundler und Schlossmann: Handbuch der Kinderheilkunde.
 Seifert: Chirurgie des Kopfes und des Halses für Zahnärzte.
 Stark: Der Zusammenhang von einfachen, chronischen und tuberkulösen Halsdrüsenanschwellungen mit kariösen Zähnen (Beitrag zur klin. Chirurgie).
 Wullstein und Willms: Lehrbuch der Chirurgie.

Lebenslauf.

Ich, Georg Herbst, wurde am 30. Dezember 1911 zu Bamberg als Sohn des Bäckermeisters Hans Herbst geboren. Dort besuchte ich dann die Volksschule und trat in das humanistische Gymnasium über. Im Frühjahr 1933 legte ich die Reifeprüfung am Gymnasium zu Coburg ab. Im Sommersemester 1933 begann ich dann an der Universität Erlangen mein zahnärztliches Studium und bestand im März 1935 die Vorprüfung. Nach diesen vier vorklinischen Semestern verweilte ich auch noch die übrige Zeit meines Studiums in Erlangen und legte im Herbst 1936 das zahnärztliche Staatsexamen dort ab.

